



どうぶつに さわったら かならず てを あらおう



しんがたコロナウイルスによる はいえんで、せかいじゅう おおさわぎしていますね。どうぶつから うつる びょうきは ほかにも あります。

どうぶつとの ふれあいは たのしいですが、きをつけないと びょうきに なってしまうことが あります。

かわいいから ペットとキスしたり、くちのまわりを なめ させたりしては いけません。じぶんのはしで たべものを あたえるのも だめです。

ふとんにいれて いっしょに ねるのも よくないそうです。 どうぶつに さわったら かならず てを あらってください。

参照：厚生労働省 HP「動物由来感染症を知っていますか？」

吉田小学校の 登下校時刻の変更

2月27日（木） 新登校班編成 集団下校 3：30

3月 6日（金） 6年感謝の会 4年～5年 6校時カット 下校2：50

※あくまでも予定です。急な変更もありますので、詳細につきましては、学校へ確認をお願いします。

不審者情報 富士吉田警察署より

ここ一か月で新たな事案は発生していません。

次のいい子の日は**3月16日(月)**です。吉小校門前 朝8時頃集合

積雪・路面の凍結に気を付けておこしてください。

富士吉田ふれあい隊は2004年から吉田小学区で登下校の見守り活動を続けている自主防犯団体です。

新型コロナウイルス

てあらいが 予防効果大

せきがでている人は、マスクをしなければなりません、マスクで ウィルス感染をふせげるかは 科学的にはっきりしていないそうです。 それよりも、よく手をあらうことが大切だという専門家もいます。

マスクを手作りする方法はYouTube などで見られます。参考まで。

YouTube「コーヒーフィルターでマスクを作ってみた」より→



https://www.youtube.com/watch?v=xkPoAc1eADM&feature=emb_logo

動物由来感染症に 感染しないために

動物由来感染症はかぜと似たような症状から始まることが多いそうなので、受診の際はペットを飼っている等、動物との接触歴を医師に伝えることが大切です。

ペットを清潔にしておくのはもちろん、動物の糞尿が乾燥すると、その中の病原体が空気中を漂い、吸い込みやすくなりますので、糞尿に直接ふれたり、病原体を吸い込んだりしないよう気をつけ、早く処理しましょう。

動物が排せつを行いがちな砂場や公園は注意が必要です。特に子供の砂遊び、ガーデニングで草むしりや土いじりをした後は、十分に手を洗いましょう。

新型コロナウイルスだけじゃない。気をつけたい 動物由来感染症

病名	症状	感染経路
パストレラ症	傷口の腫れの他に、局所リンパ節の腫脹や呼吸器病が発生する。 口移しでえさを与えない！ ふとんにいっしょに入れて寝ない！	犬の口腔内では 75%，猫ではほぼ 100%常在しているパストレラ菌が飛沫感染、濃厚接触により感染。室内飼育の増加により増加中。
猫ひっかき病	傷口の腫れの他に、全身倦怠感、発熱、リンパ節が腫れるなどの症状が出る。	猫にひっかかれた皮膚表面からバルトネラ菌に感染。
オウム病	突然の発熱（38℃以上）で発症し、咳や痰を伴う。全身倦怠感・食欲不振・筋肉痛・関節痛・頭痛等のインフルエンザのような症状。重症になると呼吸困難・意識障害等を起こし、診断が遅れると死亡する場合もある。 ペットの檻はこまめに掃除を！	インコ、オウム、ハト等の糞に含まれる菌を吸い込んだり、口移しでエサを与えることによっても感染する。2005 年、国内の動物展示施設で従業員や来場者の間で集団感染があった。
サルモネラ症	感染した人の多くが発熱、下痢、腹痛などの胃腸炎症状を呈する。菌血症、敗血症、髄膜炎等の重症の場合にはまれに死亡することもある。 台所で水槽などを洗わない！	通常サルモネラ症は汚染された食品を介して感染するが、爬虫類等の動物との接触を通じて感染することもある。日本でも子供がペットのミドリガメから感染し、重症となった例がある。
レプトスピラ症	5～14 日の潜伏期の後に、38～40℃の発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、結膜充血等の初期症状で発症する。重症の場合は、発症後 5～8 日目に黄疸、出血、腎機能障害等の症状が現れる。 手などをよく洗う！	保菌動物（犬、ネズミ等）の尿中に長期間菌が排出される。感染動物の尿に触れたり、尿に汚染された水や土等から皮膚や口を介して感染する。全国で散発的に発生しているが、地域によっては集団発生もある。

このほかに 蚊やダニによる感染症もあります。